

Группа Компаний **ФЛЕКСОМ**

УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ
ГУМАТ КАЛИЯ
ЖИДКИЙ ТОРФЯНОЙ

Гарантия урожая
и здоровья
Ваших растений!

Для оптовых закупок:
Москва 8 (495) 411-39-47
8 (495) 421-51-44
Розница: (499) 755-53-02; 8 (926) 237-87-87

www.gumat.ru

пистолет. Если требуется два шланга, их можно соединить коннектором. Вместо пистолета можно использовать дождеватели самых разных конфигураций, а также спринклеры на подставках, которые брызгают и крутятся, позволяя регулировать наклон струи. Каждый полив должен обеспечить увлажнение почвы на полную глубину залегания корней. В то же время режим полива зависит от погодных условий и характера почвы. На легких и песчаных почвах растения поливают чаще, чем на глинистых и суглинистых.

Зеленные культуры и лук потребляют немного воды, но

и поддерживают влажность почвы на уровне 80%. Чтобы корни у **корнеплодных культур**, особенно у **моркови**, ушли глубже в почву, после появления всходов поливать не рекомендуется, за исключением очень сухой погоды. Затем регулярно поливайте, не допуская пересушивания почвы, поддерживая равномерную влажность на глубине 10-20 см. При длительном перерыве в поливах их ткани пробковеют, а с возобновлением трескаются. Чтобы вода лучше впитывалась, между рядами предварительно неглубоко прорыхлите. В засушливые периоды, особенно во время цветения, в поливе нуждаются и овощные

бавленному в 8-10 раз, добавляют 20 г сернокислого аммония на 10 л воды. Подкормку повторяют, приурочивая ее к междурядной обработке почвы. **Многолетние овощные культуры** подкармливайте после каждой срезки зелени аммиачной и калийной селитрой (по 20-30 г на 10 л воды).

УБОРКА УРОЖАЯ

Регулярно снимайте урожай зелени с многолетних и подзимних посевов. Один-два раза в неделю срежьте листья щавеля, прищипывайте верхушки эстрагона, котовника, мяты – они такие ароматные. Черешки ревеня выламывайте по мере нарастания – через 1-2 недели.

Окончание.
Начало в № 11-2011

ПРОРЕЖИВАНИЕ

По мере роста растения затеяют друг друга и нуждаются в прореживании. Запоздывание с этой работой снижает урожай. Иногда приходится проводить операцию два и более раз. В большинстве случаев прореживание можно сочетать с первой прополкой рядков. Обычно его приурочивают к появлению первого-второго настоящих листьев. Если всходы появились неравномерно, то прореживание лучше провести в семядольном состоянии. При этом удаляйте все слабые растения, оставляя наиболее мощные. В погоне за быстротой получается как раз наоборот – вырываются наиболее крупные, которые хорошо захватываются рукой. Эта бессознательная ошибка приводит к отбору более слабых растений. Перед прореживанием грядку предварительно поливают водой.

Спустя 20-30 дней, в зависимости от роста и развития растений, проведите второе окончательное прореживание. Корнеплоды при втором прореживании дают уже годный к употреблению пучковый товар. Поэтому второе прореживание делайте выборочно. Выборку из загущенных мест проводите по возможности равномернее, оставляя растения на необходимом расстоянии. Всходы **моркови** в рядках сначала оставляйте на 1-2 см, затем на 4-5 см. Свеклу неизбежно приходится прореживать, так как из одного семени вырастает 3-4 растения. Первую прорывку делайте в фазе 2 настоящих листьев, оставляя всходы на 2-3 см. Спустя неделю-другую при повторном прореживании между растениями оставляйте у округлых сортов 8-10 см, у цилиндрических – 12 см. Удаленные после первого прореживания растения можно распикировать на свободную грядку, хорошо полить и прикрыть свежей травой. **Брюква** и **пастернак** имеют более крупные листья, поэтому оставляют их в ряду реже – через 10-12 см,

ОГОРОД - ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ

В предыдущем номере газеты мы рассказали о посеве теплолюбивых овощных культур, посадке рассады, уходе за растениями. Продолжаем разговор о заботах огородников в июне.

репу и **редьку** проредивайте сначала на 4 см, окончательно – на 6-8 см. Рядки **кочанного салата** рекомендуется прореживать в два приема, окончательно оставляя растения на 20-25 см, а **листовой салат** – один раз, через 10-15 см. Удаленные растения можно рассаживать на свободные места. Кустовой укроп прореживают после образования 5-го листа, так чтобы площадь питания каждого растения была 20x20 см.


ПОЛИВ

При отсутствии дождей овощи и картофель нуждаются в поливе. Чтобы избежать солнечных ожогов, растения поливают утром, вечером и даже ночью, чтобы промочить почву. Наиболее активная зона расположения корней находится на глубине 20-25 см. Частые, но незначительные поливы при сухой погоде не приносят пользы растениям, а порой даже дают отрицательный эффект, поскольку корни перестают расти вглубь.

При покупке поливочного оборудования отдавайте предпочтение спиральным шлангам меньшего диаметра (полдюйма). Скорость воды в них меньше, а давление струи больше, вода разбрызгивается из них на значительное расстояние. Такие шланги легче переносить в специальной тележке, избегая заломов и сминания растений по углам. Один конец шланга одевается на трубу, а другой – на штангу с распылителем или

из-за компактности корневой системы очень нуждаются в поливе в первые фазы роста. Запомните, что поливы или дожди во второй половине лета задерживают созревание луковицы, ухудшают ее лежкость.


Огурец и **капуста** требовательны не только к влаж-



культуры – **горох**, **бобы** и **фасоль**.

ПОДКОРМКИ

В июне отмечается усиленный рост овощных растений, в связи с чем они потребляют большое количество питательных веществ. Поэтому через каждые 10-14 суток подкармливайте растения **огурца**, **кабачка**, **тыквы**, **томата**, **перца** под корень в сухом виде или по листьям (некорневая подкормка). Для жидких подкормок лучше брать хорошо



растворимые комплексные удобрения с микроэлементами типа «Кристалон» (2 ст. ложки на 10 л воды). Минеральные подкормки необходимо чередовать с органическими – настоями коровяка (1:5), куриного помета (1:10) или зеленого удобрения. **Среднеспелые сорта капусты** подкармливают 2-3 раза азотными удобрениями через каждые 7-10 дней, чередуя подкормки с поливами, что дает возможность затормозить завязывание кочана. **Корнеплоды** впервые подкармливают после прореживания. К коровяку, раз-



Поспевают урожай редиса, салата, салатной горчицы, индау, кресс-салата, высеянных ранней весной. Чтобы сохранить зелень как можно дольше в свежем виде, ее лучше срезать утром или вечером. Листовой и кочанный салат в полиэтиленовых пакетах отлично сохраняется в течение 2 недель в холодильнике при температуре 1-2°. Только до образования цветоносов снимают листья шпината, огуречной травы, затем они становятся несъедобными. Растения мангольда целиком убирают в фазе 5-го листа через ряд, а у оставшихся растений снимают периферийные листья, чтобы быстрее нарастали молодые. В отличие от шпината и салата зелень мангольда свежа и съедобна все лето.

Зелень кервеля срезают до цветения. Поскольку кервель быстро грубеет и плохо отрастает после срезки, его убирают сразу. Выборочно срезают головки брокколи и цветной капусты диаметром 10 см. Увеличения их размеров ждать не следует, поскольку при этом снижаются их вкусовые качества. Через 5-6 суток после срезки центральной головки отрастают боковые головки, которые можно снимать все лето по мере их созревания. Массовую уборку редиса проводят на 18-25-й день после появления всходов через каждые 2-3 дня, позже он стрелкуется.

А. ЛЕБЕДЕВА,
кандидат
сельскохозяйственных наук